

Un Réseau pour la Biodiversité Transfrontalière



FICHE DESCRIPTIVE LAITUE SANGUINE

Nom scientifique: *Lactuca Sativa*.

Nom commun: *Poivron*.

Nom commun: *Laitue*.

Cultivar: *Laitue Sanguine*.

Origine géographique de la variété: *Marseille, Région PACA*.

Reproduction: *autogame*.

Maintenance: *“Le Potager d’un Curieux”, Jean Luc Danneyrolles à Saignon (Vaucluse 84)*.

Caractéristiques des SEMENCES

Couleur des graines: *blanches*.

Caractéristiques de la POMME

Forme de la pomme: *étroitement elliptique*.

Densité de la pomme : *faible*.

Taille de la pomme: *petite*.

Caractéristiques des FEUILLES

Couleur des feuilles: *vert clair tacheté de rouge*.

Pigmentation anthocyanique: *présence*.

Brillance des feuilles: *très brillantes*.

Tendance du limbe: *feuilles entières*.

Forme de la feuille: *elliptique aplati*.

Caractéristiques de la PLANTE

Diamètre de la plante: *30 à 40 cm*.

Cycle cultural

Semi: *printemps*.

Maturation commerciale: *courant juin à mi-juillet*.

Période de floraison: *courant juillet*.

LAITUE SANGUINE / CULTURE

APTITUDES ET EXIGENCES PEDOCLIMATIQUES

La petite laitue Sanguine est une variété assez rustique qui résiste bien à la chaleur. Elle se cultive sur des terrains bien exposés et ensoleillés et riche en matière organique.

EPOQUE DE SEMI, DE PLANTATION, ET DISTANCES DE PLANTATION

La laitue sanguine peut être cultivée au printemps ou en automne. Elle reste cependant plus adaptée à une culture de printemps. Pour une culture de printemps, le semis se fait à partir du mois de février, et la plantation en plein champs se réalise aux alentours du 15 mai. Le semis se fait de manière échelonné. Prévoir 14 plants au m².

EXIGENCES NUTRITIONNELLES ET APPORTS

Apports (kg/quintal de produit):

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO
0,20	0,08	0,50	0,12

Il est conseillé d'effectuer un épandage avant semis avec incorporation de la matière organique dans le sol par travail du sol. Pour assurer un bon métabolisme de l'azote et limiter l'apparition de

troubles physiologiques tels que les nécroses ou « Tip Burn », il est conseillé d'administrer de l'oxyde de calcium et de maintenir constamment le sol humide.

EPOQUE DE RECOLTE

La laitue sanguine ne pousse pas, aussi, il faut être vigilant à la récolter au bon moment: entre le moment où elle arrive à maturité et avant la mon-

taison. La récolte a lieu lorsque les rosettes atteignent 20-30 cm de diamètre (à partir de juin) et se poursuit jusqu'au mois de juillet.

MALADIES ET RAVAGEURS

Parmi les agents pathogènes, la pourriture basale causée par *Sclerotinia* spp., *Botrytis cinerea*, *Rhizoctonia solani* ainsi que le mildiou causé par *Bre-*

mia lactucae sont les problèmes phytosanitaires majeurs. Les principaux ravageurs sont les pucerons, les limaces et les noctuelles.



La Laitue Sanguine est remarquable par la beauté de ses feuilles brillantes vertes claires tachetées de rouge ainsi que par son goût de noisette et sa saveur sucrée. Elle est très rustique et est facile à cultiver.

Projet Interreg Alcotra n. 139 "Un Réseau pour la Biodiversité Transfrontalière"

www.bioeurope.info